

Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt 300 mg / überzogene Tablette

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cynacur® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cynacur® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cynacur® beachten?
3. Wie ist Cynacur® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cynacur® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1 Was ist Cynacur® und wofür wird es angewendet?

Cynacur® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden.

Cynacur® wird angewendet bei Verdauungsbeschwerden (dyspeptischen Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Cynacur® beachten?

Cynacur® darf nicht eingenommen werden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Artischocken und andere Korbblütler und/oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich (allergisch) reagieren oder ein Verschluss der Gallenwege vorliegt.

Bei Gallensteinleiden darf Cynacur® nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Bei Einnahme von Cynacur® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzuwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei gleichzeitiger Gabe von Cynacur® kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein. Deshalb kann es notwendig sein, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst werden muss. Patienten, die Cynacur® und gleichzeitig Arzneimittel mit einem dieser Wirkstoffe einnehmen, sollten daher den Rat ihres behandelnden Arztes einholen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Cynacur® soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausrei-

chenden Untersuchungen vor. Deshalb sollte Cynacur® bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cynacur®

Cynacur® enthält Lactose und Sucrose (Saccharose). Bitte nehmen Sie Cynacur® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3 Wie ist Cynacur® einzunehmen?

Nehmen Sie Cynacur® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren
3-mal täglich 1 überzogene Tablette

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

Nehmen Sie Cynacur® zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) ein.

Tabletten nicht im Liegen einnehmen.

Dauer der Anwendung

Es besteht prinzipiell keine zeitliche Begrenzung der Anwendungsdauer.

Bitte beachten Sie die speziellen Angaben unter unter Punkt 2 „Was müssen Sie vor der Einnahme von Cynacur® beachten?“ und Punkt 4 „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Cynacur® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cynacur® eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Cynacur® eingenommen haben als Sie sollten, können die Nebenwirkungen verstärkt auftreten (siehe Punkt 4

Fortsetzung auf der Rückseite >>

“Nebenwirkungen”). In diesem Fall setzen Sie Cynacur® ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Cynacur® vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cynacur® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten wurde nach Einnahme von Cynacur® über leichte Durchfälle mit typischer Begleitsymptomatik (z.B. Bauchkrämpfe) sowie über Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen berichtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollten Sie Cynacur® absetzen und einen Arzt aufsuchen.

5 Wie ist Cynacur® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

6 Weitere Informationen

Was Cynacur® enthält

Der Wirkstoff ist Artischockenblätter-Trockenextrakt.

1 überzogene Tablette enthält 300 mg Trockenextrakt aus Artischockenblättern in einem Verhältnis von Droge zu Extrakt 5,8-7,5 : 1; das Auszugsmittel ist Wasser.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Arabisches Gummi, Calciumcarbonat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), Cellulosepulver, Glycerol 85%, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Macrogol 6000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), vorverkleisterte Stärke (aus Mais), Maltodextrin, Povidon (K 90), Sucrose (Saccharose), Siliciumdioxid-Hydrat, Talkum, weißer Ton, Titandioxid (E 171)

Hinweis für Diabetiker:

1 überzogene Tablette enthält weniger als 0,03 BE.

Wie Cynacur® aussieht und Inhalt der Packung

Cynacur® ist in Packungen mit 50 (N2) und 100 (N3) überzogenen Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

HEXAL AG

Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
e-mail: service@hexal.com



Hersteller

Salutas Pharma GmbH
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2008. 629962

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!